

**Влияние защищенного протеина на прирост живой массы в
период откорма.**

Докладчик - научный сотрудник Березин А.С.
*Всероссийский научно-исследовательский институт
физиологии, биохимии и питания -филиал ФНЦ
животноводство -ВИЖ им. Л.К. Эрнста*

Таблица 1

Средняя живая масса и охват грудины у бычков в различные периоды исследований.

Дата	1 группа (распадаемость СП 65%)		2 группа (распадаемость СП 60%)		3 группа (распадаемость СП 55%)	
	Живая масса, кг	Охват грудины, см	Живая масса, кг	Охват грудины, см	Живая масса, кг	Охват грудины, см
29.03.22	199±7	142±7	197±8	141±5	199±4	142±3
28.04.22	255±13	150±3	235±16	149±4	246±5	149±3
31.05.22	291±14	155±3	268±17	156±6	277±3	158±1
29.06.22	333±12	160±2	305±18	159±3	312±10	165±4
28.07.22	368±12	168±3	365±14	167±3	360±7	168±3
30.08.22	400±7		410±13		407±5	

Таблица 2

Среднесуточный прирост живой массы бычков за весь период выращивания.

Группа	Начальная живая масса, кг	Конечная живая масса	Среднесуто чный прирост за 155 суток	Среднесуто чный прирост по линии тренда
1 группа (распадаемость СП 65%)	199±7	400±7	1.30±0.01	1.28*
2 группа (распадаемость СП 60%)	197±8	410±5	1.37±0.03	1.38**
3 группа (распадаемость СП 55%)	199±4	407±13	1.34±0.05	1.31

* - различия с группой 3 на уровне тенденции с $p < 0.1$

** - достоверные различия с 1 и 3 группами на уровне $p < 0.05$

Спасибо за внимание!